



KLEINDIER
MAGAZINE



Vaccinatieschema voor diergroep konijnen



Engelse hangoren
blij na de enting

Kleindier Liefhebbers Nederland

www.kleindierliefhebbers.nl

info@kleindierliefhebbers.nl

dierenarts vaccineert aan huis bij
begin tentoonstellingsseizoen

kleindierliefhebbers.nl

kleindierliefhebbers.nl

uitgave 2024



verzamenen voor de
verplichte RVHD enting



dierenarts en de
konijnen

Tijdens opfok en tijdens fokprogramma en/of tentoonstellingsseizoen

Muggen en vliegen bestrijden door o.a. nestkastjes voor vleermuizen op te hangen en ingangen voor zwaluwnesten beschikbaar stellen.

Myxomatose

2 x injectie myxomatosevaccine met 6 weken tussentijd, halfjaarlijks herhalen bij alle fokdieren voor begin van fokseizoen of

1 x injectie met Nobivac Myxo-RHD plus vanaf leeftijd van 7 weken, elk jaar herhalen bij alle fokdieren voor begin van fokseizoen met Nobivac Myxo-RHD plus.

RVHD: Rabbit Viral Haemorrhagic Disease: RVHD type 1 en/of RVHD type 2

Injectie met Eravac, Yurvac RHD of Fatrovax RHD vanaf leeftijd van 30 dagen en dan jaarlijks herhalen of

2 x injectie met Filavac VHD k c+v met 6 weken tussentijd. Jaarlijks herhalen bij alle fokdieren voor begin fokseizoen injectie met Filavac VHD k c+v of

1 x injectie met Nobivac Myxo-RHD plus vanaf leeftijd van 7 weken, jaarlijks herhalen.

Download : www.kleindierliefhebbers.nl: entverklaring RVHD

Snot: Pasteurella, Bordetella

Er zijn geen geregistreerde vaccins. Het is wel mogelijk een vaccin te maken van de stammen voorkomend bij de konijnen in de eigen stal.

Dikke buiken ziekte: enterocolitis: Clostridium

Er zijn geen geregistreerde vaccins. Het is wel mogelijk een vaccin te maken van de stammen voorkomend bij de konijnen in de eigen stal.

Drs H T Arts dierenarts KleindierLiefhebbers Nederland
KLN 1 november 2024



MYXOMATOSE entstoffen



huisbezoek dierenarts: samen de
verplichte RVHD enting uitvoeren



verplichte entverklaring
na de vaccinatie



RVHD type 2 entstoffen

Aanpak van parasitaire aandoeningen van belang voor goede groei van de opfok jonge konijnen:

Clostridium: enterocolitis: dikke buikenziekte

- Door het drinkwater bacitracine (Bacivet-S) geven tijdens risicoleeftijden en risicoseizoenen.
- Voldoende NDF fractie (Neutral Detergent Fibre) ofwel voldoende ruwvezel en ruwe celstof in de voeding.

Coccidiose

- Elke week mest uit de hokken verwijderen, eventueel hokken daarna ontsmetten met cresol (Neopredisan) spray of met ammoniak spray.
- Behandelen vanaf 4 weken leeftijd 1 dag per week met toltrazuril of diclazuril door het drinkwater of ingeven in de bek, of 1 dag per week Sulfapreparaten (sulfadimidine, sulfaquinoxaline) in het drinkwater, of 2 dagen per week amprolium in het drinkwater of injectie met toltrazuril suspensie na spenen. Medicatie is inzetbaar met geregistreerde middelen en duidelijke informatie over de toediening aan de konijnen.
- Eventueel konijnenvoer geven met coccidiostaticum in het voer gemengd (Clinacox (diclazuril) 1 ppm)

Wormen

- Elke week mest uit de hokken verwijderen, eventueel hokken daarna ontsmetten met cresol (Neopredisan) of met ammoniak spray.
- Behandel de opfokdieren elke 6 weken met ontwormmiddel, fenbendazole of flubendazole als pasta in de mond of als oplossing in het drinkwater.
- Behandel de konijnen voor begin van de fokkerij voor het fokseizoen tegen wormen.

Mijten: oormijten, vachtmijten

- Konijnen voor de tentoonstelling behandelen met ivermectine, injectie onderhuids of met druppels op de huid in de nek.
- Tijdens of na behandeling de hokken goed schoonmaken en met bladblazer haren en stof verwijderen.

Myiasis: maden van vliegen in de vacht en huid

- Goed de huid en haren schoonhouden van ontlasting, vooral bij anus en achterhand.
- Vliegen bestrijden met vliegengaas voor de ingang van de hokken.
- Eventueel konijnen behandelen met spray of druppels op de huid.
- Eventueel de omgeving sprayen met spinosad of diazinon. Konijnen mogen aanwezig blijven tijdens deze behandeling.

Drs H T Arts dierenarts KleindierLiefhebbers Nederland
KLN 1 november 2024